

Texto de rotulagem

Alumimax

hidróxido de alumínio 60mg/mL

Agite bem antes de usar

SUSPENSÃO ORAL

Uso oral

USO ADULTO

Contém 100mL

COMPOSIÇÃO

Cada mL de suspensão oral contém: hidróxido de alumínio 60 mg e excipientes q.s.p. 1 mL

INDICAÇÕES: Antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.

MODO DE USAR : uso interno. Tomar de 5 a 10 ml, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico.

ADVERTÊNCIAS: Agite antes de usar. Obstipante.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.03841-3.

Natulab Laboratório S. A.

Rua José Rocha Galvão nº 2, Galpão III - Salgadeira

Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.444-312

CNPJ: 02.456.955/0001-83

Responsável Técnico: Olavo Souza Rodrigues

Texto de rotulagem

CRF/BA 4826

Indústria Brasileira

Logo Natulab

Logo com assinatura do SAC

0800 730 7370

www.natulab.com.br

Código de barras: 7898133134456

Raspe aqui com um objeto de metal