

Texto de rotulagem

100% Óleo mineral

Petrolato líquido

LAXANTE E TERAPIA EM USO TÓPICO PARA PELE RESSECADA E ÁSPERA.

uso oral ou tópico

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

Contém 100mL

COMPOSIÇÃO

petrolato líquido (óleo mineral) 100%.

INDICAÇÃO: Laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera.

MODO DE USAR: No tratamento da prisão de ventre, 15 mL (1 colher de sopa) à noite e outra dosagem no dia seguinte ao despertar. Caso não obtenha êxito, aumente a dosagem para 30 mL (2 colheres de sopa) à noite e 15mL pela manhã. Crianças maiores de 6 anos: (1-2mL) por kg de peso à noite ou pela manhã). Administração a crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico.

CONTRAINDICAÇÕES: Deve-se evitar o uso na presença de náuseas, vômitos, dor abdominal, gravidez, dificuldade de deglutição, refluxo gastroesofágico e em pacientes acamados. Esse medicamento é contraindicado para crianças menores de 6 anos.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Laxantes não devem ser utilizados por mais de 1 semana a menos que indicado por um médico. Não administrar junto com alimentos ou quando houver presença de hemorragia retal. Se notar alteração repentina dos hábitos intestinais durante duas semanas, consulte um médico antes de fazer uso de laxantes. Desaconselhável após cirurgia anorretal, pois poderá causar prurido anal. A exposição ao sol após aplicação do produto na pele pode provocar queimaduras. O produto não contém protetor solar e não protege contra os raios solares. Há risco de toxicidade por aspiração. Uso durante a gravidez e lactação: o uso crônico durante a gravidez pode causar hipoprotrombinemia e doenças hemorrágicas do recém-nascido.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e amamentação, exceto sob a orientação médica.

Interações medicamentosas: o uso prolongado pode reduzir a absorção das vitaminas lipossolúveis (a, d, e, k), cálcio, fosfatos e alguns medicamentos administrados por via oral, como anticoagulantes, cumarínicos, ou indandiônicos, anticoncepcionais e glicosídeos cardíacos.

Reações adversas: efeitos metabólicos, redução do nível sérico de beta-caroteno, efeito gastrintestinais. Dosagem oral excessiva pode resultar em incontinência e prurido anal.

Efeitos respiratórios: "Atenção: O uso oral de óleo mineral aumenta o risco de desenvolvimento de pneumonia lipoídica. Pacientes com disfagia, desordens neuromusculares que afetam a deglutição e o reflexo do vômito, além de alterações estruturais da faringe e esôfago apresentam risco aumentado de desenvolvimento de pneumonia lipoídica. Esta predisposição é potencializada em neonatos e idosos. "

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30°C).

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199 de 2006. AFE nº 1.03841-3.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Texto de rotulagem

Natulab Laboratório S. A.

Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira

Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.444-312

CNPJ: 02.456.955/0001-83

Responsável Técnico: Olavo Souza Rodrigues

CRF/BA 4826

Indústria Brasileira

Logo com assinatura do SAC

0800 730 7370

www.natulab.com.br

Cód. de barras: 7898133138898