



## TILEMAXY

paracetamol 100mg/mL

paracetamol 160mg/5mL (equivalente a 32mg/mL)

## APRESENTAÇÕES

**TILEMAXY Baby** - **Linha Farma:** Suspensão oral em frasco plástico com 15mL, contendo 100mg/mL de paracetamol (sabor frutas). Acompanha uma seringa dosadora.

**TILEMAXY Criança** - **Linha Farma:** Suspensão oral em frasco plástico com 60mL, contendo 32mg/mL de paracetamol (sabor frutas). Acompanha um copo-medida.

## USO PEDIÁTRICO

### USO ORAL

## COMPOSIÇÃO

### TILEMAXY Baby:

Cada mL da suspensão contém:

paracetamol ..... 100mg  
Excipientes:\* ..... 1mL

\*(ácido cítrico, benzoato de sódio, glicerol, celulose microcristalina, carmelose sódica, sacarina sódica, aroma de frutas vermelhas, vermelho de ponceau, sorbitol, goma xantana e água purificada).

### TILEMAXY Criança:

Cada mL da suspensão contém:

paracetamol ..... 32mg  
Excipientes:\* ..... 1mL

\*(ácido cítrico, benzoato de sódio, glicerol, celulose microcristalina, carmelose sódica, sacarina sódica, aroma de frutas vermelhas, aroma de tutti frutti, vermelho de ponceau, sorbitol, goma xantana e água purificada).

## 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

**Uso adulto.** Indicado para a redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.

**Uso pediátrico.** Indicado para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.

## 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**TILEMAXY Baby** e **TILEMAXY Criança** reduzem a febre atuando no centro regulador da temperatura no Sistema Nervoso Central (SNC) e diminuem a sensibilidade



para a dor. O efeito destes medicamentos se inicia dentro de 15 a 30 minutos após a administração oral.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**TILEMAXY Baby e TILEMAXY Criança** não devem ser administrados se a criança tiver alergia ao paracetamol ou a qualquer outro componente de sua fórmula.

### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada. **NÃO** administrar este medicamento diretamente na boca do paciente.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não use com outro produto que contenha paracetamol. Este medicamento contém paracetamol.

Pacientes adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda no caso de ingestão de mais de 4g de paracetamol em 24 horas, uso concomitante de outros medicamentos contendo paracetamol ou ingestão de 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento.

Consulte seu médico antes de usar o medicamento se você já possui problemas no fígado. Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfari na ou outros derivados cumarínicos.

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**TILEMAXY Baby e TILEMAXY Criança** devem ser conservados em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegidos da luz.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

**TILEMAXY Baby e TILEMAXY Criança** são suspensões de cor vermelha com sabor e aroma artificial de frutas.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**


Uso oral.

**TILEMAXY Baby:** Encaixe a seringa dosadora no adaptador do frasco. Encha a seringa dosadora até o nível correspondente em Kg (peso do bebê). Coloque vagarosamente o líquido dentro da boca do bebê, entre a gengiva e o lado interno da bochecha.

**TILEMAXY Criança:** Para utilizar o copo-medida, encha-o até o nível correspondente em mL.

### **INSTRUÇÕES PARA ABRIR E FECHAR O FRASCO:**

# Natulab



Agite o frasco. Para abrir o frasco é preciso pressionar a tampa para baixo e girar ao mesmo tempo no sentido anti-horário, mantendo-a pressionada. Para fechar, basta girar no sentido contrário ao de abertura sem apertar em demasia.

**TILEMAXY Baby:** para uma posologia correta, administre a dose do medicamento de acordo com o peso da criança e o volume (mL) correspondente indicado na seringa dosadora.

**Uso adulto:** O paracetamol pode ser administrado independentemente das refeições. A dose diária total de paracetamol não deve exceder tanto a dose de 75mg/Kg (0,75mL/Kg) quanto 4000mg (40mL) no período de 24 horas.

**Uso pediátrico (abaixo de 12 anos):** A dose recomendada de paracetamol varia de 10 a 15mg/Kg/dose (0,1mL a 0,15mL/Kg/dose), com intervalos de 4 a 6 horas entre cada administração. Não exceda 5 administrações (aproximadamente 50-75mg/Kg) (0,5mL-0,75mL/Kg), em um período de 24 horas. Para crianças abaixo de 11Kg ou 2 anos, consulte o médico antes do uso.

**TILEMAXY Criança:** para uma posologia correta, administre a dose do medicamento de acordo com o peso da criança e o volume (mL) correspondente indicado no copo-medida.

**Uso adulto:** O paracetamol pode ser administrado independentemente das refeições. A dose diária total de paracetamol não deve exceder tanto a dose de 75mg/Kg (2,3mL/Kg) quanto 4000mg (125mL) no período de 24 horas.

**Uso pediátrico (abaixo de 12 anos):** A dose recomendada de paracetamol varia de 10 a 15mg/kg/dose (0,3mL a 0,5mL/Kg/dose), com intervalos de 4 a 6 horas entre cada administração. Não exceda 5 administrações (aproximadamente 50-75mg/Kg) (1,5mL-2,3mL/Kg), em um período de 24 horas. Para crianças abaixo de 11Kg ou 2 anos, consulte o médico antes do uso.

**Duração do tratamento:** depende do desaparecimento dos sintomas.

Consulte as tabelas abaixo para saber a dose correta.

## TILEMAXY Baby Suspensão Oral (100mg/mL)

Peso (Kg)	Dose (mL)
3	0,4
4	0,5



5	0,6
6	0,8
7	0,9
8	1,0
9	1,1
10	1,3
11	1,4
12	1,5
13	1,6
14	1,8
15	1,9
16	2,0
17	2,1
18	2,3
19	2,4
20	2,5
Para crianças abaixo de 11Kg ou 2 anos, consulte seu médico.	

#### **TILEMAXY Criança Suspensão Oral (32mg/mL)**

Peso (Kg)	Dose (mL)
11 - 15	5
16 - 21	7,5
22 - 26	10
27 - 31	12,5
32 - 43	15
Para crianças abaixo de 11Kg ou 2 anos, consulte seu médico.	

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esquecer de administrar uma dose do medicamento, faça-o assim que se lembrar no caso de ainda haver necessidade, e então ajuste o horário das próximas tomadas. Não tome a dose dobrada para compensar a dose esquecida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Este medicamento pode causar algumas reações desagradáveis inesperadas. Caso ocorra uma reação alérgica, o medicamento deve ser descontinuado.

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): urticária, coceira e vermelhidão no corpo, reações alérgicas a este medicamento e aumento das transaminases e erupção fixa medicamentosa.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**



## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

O uso de doses excessivas, acima das doses recomendadas (superdose) pode causar danos ao fígado. Em caso de superdose, procure ajuda médica ou um centro de intoxicação imediatamente. O apoio médico imediato é fundamental para adultos e crianças, mesmo se os sinais e sintomas de intoxicação não estiverem presentes. Os sinais e sintomas iniciais que se seguem a uma dose potencialmente hepatotóxica de paracetamol são: perda de apetite, náusea, vômito, sudorese intensa, palidez e mal-estar geral.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **DIZERES LEGAIS**

MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576/2021.

Farm. Responsável: Cristiano Alves França – CRF/BA 7573

**NATULAB LABORATÓRIO S. A.**

Rua José Rocha Galvão nº2, Galpão III – Salgadeira

Santo Antônio de Jesus - Bahia – CEP - 44.444-312

CNPJ: 02.456.955/0001-83

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: 0800 730 7370

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

