

SEAKALM

(Passiflora incarnata L.)

Natulab Laboratório S.A.

Comprimidos revestidos

260mg

600mg

PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO

Nomenclatura popular: Maracujá, Passiflora.

Nomenclatura botânica completa: *Passiflora incarnata* L.

Família: Passifloraceae

Parte da planta utilizada: Partes aéreas

Produto registrado com base no uso tradicional, não sendo recomendado seu uso por período prolongado.

SEAKALM 260 mg/COM REV (menor concentração)

Forma farmacêutica: comprimido revestido

Cada comprimido contém 260mg de extrato seco de *Passiflora incarnata* L. que correspondem a 9,1mg de flavonoides totais calculados como vitexina.

SEAKALM 600mg/COM REV (maior concentração)

Forma farmacêutica: comprimido revestido

Cada comprimido contém 600mg de extrato seco de *Passiflora incarnata* L. que correspondem a 22,2mg de flavonoides totais calculados como vitexina.

APRESENTAÇÕES:

SEAKALM 260mg/COM REV

Linha Farma: Embalagem contendo 20, 30 ou 100 comprimidos revestidos.

SEAKALM 600mg/COM REV

Linha Farma: Embalagem contendo 20 ou 30 comprimidos revestidos.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO SEAKALM 260mg/COM REV

Cada comprimido revestido contém:

Extrato seco de *Passiflora incarnata* L.....260mg
(padronizado em 3,5% de flavonoides totais calculado como vitexina). Equivalente a 9,1mg de flavonoides totais calculado como vitexina/comprimido revestido.

Excipientes*.q.s.p. 1 comprimido revestido.

*croscarmelose sódica, celulose microcristalina, dióxido de silício, lactose monoidratada, copovidona, estearato de magnésio, dextrina, hipromelose, etilcelulose, citrato de trietila, dióxido de titânio, azul brilhante 133 laca de alumínio, amarelo de quinolina laca de alumínio, água purificada** e álcool etílico.**

**Evapora no processo.

COMPOSIÇÃO SEAKALM 600mg/COM REV

Cada comprimido revestido contém:

Extrato seco de *Passiflora incarnata* L..... 600mg
(padronizado em 3,7% de flavonoides totais calculado como vitexina). Equivalente a 22,2mg de flavonoides totais calculado como vitexina/comprimido revestido.

Excipientes*.q.s.p. 1 comprimido revestido.

*croscarmelose sódica, celulose microcristalina, dióxido de silício, lactose monoidratada, copovidona, estearato de magnésio, hipromelose, dióxido de titânio, etilcelulose, citrato

de trietila, azul brilhante 133 laca de alumínio, vermelho 27 laca de alumínio, álcool etílico** e água purificada**.

**Evapora no processo.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE PRODUTO É INDICADO?

Este produto é indicado para o tratamento da ansiedade leve, como estados de irritabilidade, agitação nervosa, tratamento de insônia e desordens da ansiedade.

2. COMO ESTE PRODUTO FUNCIONA?

Este produto atua no sistema nervoso central, produzindo efeito sedativo e prolongando o período de sono.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE PRODUTO?

Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso deste produto. Este produto não deve ser utilizado junto a bebidas alcoólicas. Também não deve ser associado a outros medicamentos com efeito sedativo, hipnótico e anti-histamínico.

Mulheres grávidas ou amamentando não devem utilizar este produto, já que não há estudos que possam garantir a segurança nessas situações.

Este produto é contraindicado para uso por pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este produto é contraindicado para menores de 12 anos.

Atenção: Contém lactose (tipo de açúcar) abaixo de 0,25g/comprimido revestido. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

SEAKALM 260mg

Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, azul brilhante 133 laca de alumínio e amarelo de quinolina laca de alumínio.

SEAKALM 600mg

Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, azul brilhante 133 laca de alumínio e vermelho 27 laca de alumínio.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE PRODUTO?

Em casos de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Não ingerir doses maiores do que as recomendadas.

Este produto não deverá ser utilizado junto a bebidas alcoólicas, face à potencialização dos seus efeitos.

Crianças menores de 12 anos não devem usar este produto sem orientação médica.

Pode ocorrer sonolência durante o tratamento. Neste caso o paciente não deverá dirigir veículos ou operar máquinas, já que a habilidade e atenção podem ficar reduzidas.

Este produto potencializa os efeitos sedativos do pentobarbital e hexobarbital, aumentando o tempo de sono de pacientes.

Há indícios de que as cumarinas presentes na espécie vegetal apresentam ação anticoagulante potencial e possivelmente interagem com varfarina, porém não há estudos conclusivos a respeito.

O uso deste produto junto a drogas inibidoras da monoamino oxidase (isocarboxazida, fenelzina e tranilcipromina) pode provocar efeito aditivo.

Caso os sintomas persistam ou piorem, ou apareçam reações indesejadas não descritas na embalagem ou no folheto informativo, interrompa seu uso e procure orientação do profissional de saúde.

Se você utiliza medicamentos de uso contínuo, busque orientação de profissional de saúde antes de utilizar este produto.

Este produto não deve ser utilizado por período superior ao indicado, ou continuamente, a não ser por orientação de profissionais de saúde.

Informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. Interações podem ocorrer entre produtos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao mesmo tempo.

Atenção: Contém lactose (tipo de açúcar) abaixo de 0,25g/comprimido revestido. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

SEAKALM 260mg

Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, azul brilhante 133 laca de alumínio e amarelo de quinolina laca de alumínio.

SEAKALM 600mg

Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, azul brilhante 133 laca de alumínio e vermelho 27 laca de alumínio.

O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista. Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE PRODUTO?

Conservar o produto em sua embalagem original, protegendo da luz e umidade. Manter em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C).

Nestas condições, o produto se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use produto com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, guarde o produto na embalagem original.

SEAKALM 260mg apresenta-se como comprimido revestido, circular, amarelo-limão.

SEAKALM 600mg apresenta-se como comprimido revestido, oblongo, lilás.

Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Este produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE PRODUTO?

USO ORAL/USO INTERNO

SEAKALM 260mg: Ingerir 2 comprimidos revestidos, 2 vezes ao dia (a dose diária é de 36,4mg de flavonoides totais calculados como vitexina).

SEAKALM 600mg: Ingerir 1 comprimido revestido, 2 vezes ao dia (a dose diária é de 44,4mg de flavonoides totais calculados como vitexina).

Não deve ingerir mais de 05 comprimidos revestidos ao dia.

Os produtos tradicionais fitoterápicos não devem ser administrados pelas vias injetável e oftálmica.

Este produto não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE PRODUTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste produto, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação de profissional de saúde.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE PRODUTO PODE ME CAUSAR?

A frequência de ocorrência dos efeitos indesejáveis não é conhecida.

Nas doses recomendadas não são conhecidos efeitos adversos ao produto.

Raramente podem ocorrer reações adversas como náuseas, vômitos, dor de cabeça e taquicardia.

Doses excessivas poderão provocar sedação prolongada e estados de sonolência.

Informe ao seu profissional de saúde o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do produto. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema Vigimed, disponível no Portal da Anvisa.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE PRODUTO?

Alguns dos sintomas de superdosagem são sedação, diminuição da atenção e dos reflexos. Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.

Em caso de uso de grande quantidade deste produto, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou folheto informativo, se possível.

Em caso de intoxicação ligue 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

DIZERES LEGAIS

Registro:1.3841.0039

Registrado e produzido por:

NATULAB LABORATÓRIO S.A

Rua José Rocha Galvão, N° 02, Galpão III - Salgadeira

Santo Antônio de Jesus - Bahia - CEP 44.444-312

CNPJ 02.456.955/0001-83

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: 08007307370

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.

Este folheto informativo foi atualizado conforme Folheto Informativo Padrão aprovado pela Anvisa em 09/10/2014.



Histórico de alteração do folheto informativo

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que alterou o folheto				Dados das alterações nos folhetos	
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens do folheto informativo	Apresentações relacionadas
30/12/2025	-	10681-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Notificação de alteração de folheto informativo – publicação no Bulário RDC 60/12	30/12/2025	-	10681-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Notificação de alteração de folheto informativo – publicação no Bulário RDC 60/12	30/12/2025	APRESENTAÇÕES 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?	260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 600 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 600 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 260 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 100
17/09/2024	1275554/24-5	10681-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Notificação de alteração de folheto informativo – publicação no Bulário RDC 60/12	17/09/2024	1275554/24-5	10681-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Notificação de alteração de folheto informativo – publicação no Bulário RDC 60/12	17/09/2024	QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? DIZERES LEGAIS	260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 600 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 600 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 100 ML + COP
26/03/2024	0379225/24-7	10681-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Notificação de alteração de folheto informativo – publicação no Bulário RDC 60/12	26/03/2024	0379225/24-7	10681-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Notificação de alteração de folheto informativo – publicação no Bulário RDC 60/12	26/03/2024	Apresentações	260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 600 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 600 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 100 ML + COP
23/09/2021	3764682/21-3	10681-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO-	23/09/2021	3764682/21-3	10681-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO-	23/09/2021	Apresentações Composições	260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 600 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 100 ML + COP

		Notificação de alteração de folheto informativo – publicação no Bulário RDC 60/12			Notificação de alteração de folheto informativo – publicação no Bulário RDC 60/12		Dizeres Legais	
23/09/2021	3761960/21-2	10665 PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO – Inclusão inicial de folheto informativo – Publicação no Bulário RDC 60/2012	23/09/2021	3761960/21-2	10665 PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO – Inclusão inicial de folheto informativo – Publicação no Bulário RDC 60/2012	23/09/2021	Versão inicial	260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 600 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 100 ML + COP
02/07/2020	2122459/20-5	10681-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Notificação de Alteração de Texto de Folheto Informativo- RDC 60/12	15/12/2019	3482537/19-1	10670-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Inclusão de nova concentração	08/06/2020	Apresentações Composição O que devo saber antes de usar este produto? Onde, como e por quanto tempo posso guardar este produto? Como devo usar este produto?	260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 600 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 100 ML + COP
17/07/2019	0626855/19-5	10678-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Notificação de Alteração de Texto de Folheto Informativo	17/07/2019	0626855/19-5	10678-PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO- Notificação de Alteração de Texto de Folheto Informativo	17/07/2019	Quais os males que este produto pode me causar?	260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 260 MG COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 500 260 MG COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 1000 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 100 ML + COP 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 120 ML + COP 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 150 ML + COP 90 MG/ML SOL OR CT 60 FLAC PLAS TRANS X 10 ML 90 MG/ML SOL OR CX 50 FR PLAS AMB X 100 ML + 50 COP 90 MG/ML SOL OR CX 50 FR PLAS AMB X 120 ML + 50 COP 90 MG/ML SOL OR CX 50 FR PLAS AMB X 150 ML + 50 COP 90 MG/ML SOL OR CX 100 FR PLAS AMB X 100 ML + 100 COP 90 MG/ML SOL OR CX 100 FR PLAS AMB X 120 ML + 100 COP 90 MG/ML SOL OR CX 100 FR PLAS AMB X 150 ML + 100 COP.
02/02/2016	1224291/16-8	10665 – PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO – Inclusão inicial de Texto	02/02/2016	1224291/16-8	10665 – PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO – Inclusão inicial de Texto	02/02/2016	1º submissão de Folheto Informativo.	260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 260 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 260 MG COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 500

		de folheto Informativo – publicação no Bulário RDC 60/12			de folheto Informativo – RDC 60/12			260 MG COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 1000 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 100 ML + COP 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 120 ML + COP 90 MG/ML SOL OR CT FR PLAS AMB X 150 ML + COP 90 MG/ML SOL OR CT 60 FLAC PLAS TRANS X 10 ML 90 MG/ML SOL OR CX 50 FR PLAS AMB X 100 ML + 50 COP 90 MG/ML SOL OR CX 50 FR PLAS AMB X 120 ML + 50 COP 90 MG/ML SOL OR CX 50 FR PLAS AMB X 150 ML + 50 COP 90 MG/ML SOL OR CX 100 FR PLAS AMB X 100 ML + 100 COP 90 MG/ML SOL OR CX 100 FR PLAS AMB X 120 ML + 100 COP 90 MG/ML SOL OR CX 100 FR PLAS AMB X 150 ML + 100 COP.
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--